



CONSENTIMIENTO INFORMADO.

RESECCIÓN Y ANASTOMOSIS DE LA LARINGE-TRÁQUEA.

Paciente: _____

Edad: _____ .

Compañía: _____ .

Nº de Historia: _____ .

DNI: _____ .

Don/Doña: _____ .

Edad: _____ .

En calidad de representante legal, con DNI: _____ .

El Doctor/a:

De la Unidad de Cirugía Torácica me ha explicado de forma clara y que he comprendido que es preciso, dado el proceso clínico que presento, la realización de una **RESECCIÓN Y ANASTOMOSIS DE LA LARINGE-TRÁQUEA**. y/o _____ .

1.- Objetivo de la intervención: mediante este procedimiento se pretende solucionar y reparar la lesión existente en mi laringe y tráquea que produce un estrechamiento que impide la entrada y salida normal del aire.

La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos.

2.- Cómo se realiza: mediante una incisión en el cuello y/o a través del esternón se identifica la zona lesionada de la tráquea y laringe. Se trata de una lesión compleja en la que, en la mayoría de los casos es preciso extirpar la zona dañada de la tráquea y parcialmente los cartílagos de la laringe. Posteriormente se reconstruye suturando los extremos de la tráquea seccionada y la laringe. Estas suturas, en ocasiones, se refuerzan utilizando algún tejido de las zonas próximas (músculo, grasa, etc).

Con frecuencia hay que dejar un tutor o tubo de silicona en el interior de la tráquea para estabilizar y asegurar la zona de la intervención. Este dispositivo sirve de sustento para las suturas así como para permitir la ventilación y aportar un acceso rápido a la vía aérea en caso de necesidad. Este tubo se deja colocado entre 10 días y 3 meses, según cada caso.

Habitualmente hay que dejar uno o varios drenajes para eliminar la sangre y/o líquido inflamatorio que se produce durante la intervención y tras esta.


Al haber seccionado un segmento de la tráquea y la laringe, ésta queda más corta. Para evitar posibles complicaciones en las suturas es necesario mantener el cuello flexionado en los primeros días postoperatorios (al menos 7, con frecuencia entre 10 y 21). Para esto se utilizan suturas o mecanismos que evitan la extensión del cuello.

Como se modifica la forma de la laringe es frecuente que se produzca un cambio en el tono de la voz, generalmente volviéndose algo más grave.

Se me ha informado de que debido a hallazgos intraoperatorios o a los resultados del análisis de muestras tomadas durante la intervención, es posible que haya que modificar el procedimiento planificado previamente.



3.- Imágenes o esquemas explicativos:



4.- Anestesia y administración de sangre y hemoderivados: he sido advertido/a de que es precisa la administración de anestesia local o general y que es posible que (excepcionalmente) durante o después de la intervención sea necesaria la administración de sangre y/o hemoderivados, de cuyos riesgos me informarán los servicios de hematología y anestesiología.

5.- Riesgos derivados de la intervención: he sido informado/a de que a pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse efectos indeseables. Lo más habitual son molestias ligeras en garganta, algunos esputos teñidos de sangre, tos persistente o aumento de las secreciones. No obstante, en algunos casos extremos se pueden producir infecciones respiratorias, hemorragia importante, fracaso multiorgánico, accidentes cerebro-vasculares, alteraciones o insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria. El médico me ha explicado que estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico, pero pueden llegar a requerir una intervención quirúrgica.

Aunque es muy bajo, existe el riesgo de mortalidad durante el procedimiento o en el periodo postoperatorio.

La intervención se realiza muy próxima a los nervios que dan movilidad a las cuerdas vocales. Existe el riesgo de lesión de los mismos, produciéndose parálisis de una o de ambas cuerdas vocales.

Se me ha indicado la necesidad de advertir de mis posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia que pueda influir en el transcurso del procedimiento o el periodo posterior.

Por las patologías acompañantes que presento de forma concreta (diabetes, obesidad, hipertensión, anemia, edad avanzada, etc _____) puede aumentar la frecuencia o la gravedad de riesgos o complicaciones como: _____ .

He entendido la información que se me ha transmitido en un lenguaje claro y sencillo. El médico que me ha atendido ha permitido que le realice las observaciones que he considerado pertinentes y me ha aclarado todas las dudas que me han surgido.

6.- Posibilidad de cambio de opinión respecto al procedimiento: se me ha transmitido y tengo claro que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presto.



CONSENTIMIENTO: con el siguiente consentimiento pongo de manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que entiendo la necesidad y la técnica del procedimiento quirúrgico, así como los riesgos del mismo.

En este caso concreto: **RESECCIÓN Y ANASTOMOSIS DE LA LARINGE-TRÁQUEA..**

En _____ a _____ de _____ de _____ .

Fdo: El/la Médico.

Fdo: El/la Paciente.

Fdo: El representante legal, familiar o allegado.

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.

Paciente: _____ Edad: _____ .

_____ .

Compañía: _____ N° de Historia: _____ .

DNI: _____ .

Don/Doña: _____ Edad: _____ .

En calidad de representante legal, con DNI: _____ .

REVOCO el consentimiento para la intervención que se me propuso, con fecha de _____ y no deseo proseguir con la intervención.

En _____ a _____ de _____ de _____ .

Fdo: El/la Médico.

Fdo: El/la Paciente.

Fdo: El representante legal, familiar o allegado.